



PRACOVISKO: DETSKÉ KARDIOCENTRUM

Informácia pre rodičov pred lekársym zákrokom v anestézii

Vážení rodičia, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie. To, čo bude nejasné, Vám radi osobne vysvetlíme.

Všetky bolestivé lekárske zákroky sa u detí robia v anestézii, ktorá odstraňuje pocit bolesti. Počas podávania anestézie sú kontrolované životne dôležité funkcie organizmu, predovšetkým činnosť srdca a dýchanie. Anestéziu vykonáva anestéziológ. Je to lekár - špecialista v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ktorý má skúsenosti s anestéziou u detí. Lekárovi pomáha sestra, ktorá je špecialistka na detskú anestéziu. Vďaka ich spolupráci bude Vaše dieťa počas celého lekárskeho zákroku v bezpečí.

Celková anestézia

Je to stav kontrolovaného bezvedomia, do ktorého sa dieťa dostane vďaka liekom – anestetikám. Asi 30 minút pred zákrokom dieťa dostane premedikáciu – tabletku alebo sirup, ktoré zmiernia strach, stres dieťaťa a uľahčia začiatok anestézie. Anestézia začína podaním anestetika do žily cez kanylu (tenká hadička zasunutá do žily). Alebo dieťa vdychuje plynné anestetikum, čo je bezbolestné, a kanyla sa do žily dieťaťa zavedie až keď začne anestézia pôsobiť a dieťa pichnutie necíti. Anestézia trvá od začiatku do konca lekárskeho zákroku.

Miestne znecitlivenie

Odstraňuje pocit bolesti v tej časti tela, kde lekár robí zákrok. Používa sa na to liek – lokálne anestetikum. Najčastejšie sa podáva vpichnutím priamo do miesta lekárskeho zákroku, alebo do okolia nervov, ktoré vedú bolesť z miesta zákroku. U detí sa miestne znecitlivenie (umŕtvnenie) väčšinou kombinuje s celkovou anestéziou, takže dieťa pri vpichovaní lokálneho anestetika spí a necíti bolesť. Dieťa sa pri kombinácii celkovej anestézie a miestneho znecitlivenia rýchlejšie prebudí a bolesť nebude cítiť aj niekoľko hodín po prebudení.

Príjem stravy a tekutín

Pri lekárskom zákroku v celkovej anestézii je nebezpečné vdýchnutie zvratkov (zvyšky jedla, či tekutín zo žalúdka). Preto musí mať dieťa počas anestézie aj po nej prázdny žalúdok. Dieťa môže naposledy jesť 6 hodín pred operáciou. Najlepšie je, ak jedlo naposledy dostane večer pred operáciou. Piť môže len číre tekutiny (voda, čaj) 2 hodiny pred operáciou. Dojčiť možno dieťa naposledy 4 hodiny pred celkovou anestéziou.

Bolesť po operácii

Vďaka pôsobeniu anestézie a miestneho znecitlivenia by dieťa ešte niekoľko hodín po operácii nemalo cítiť bolesť. Lieky proti bolesti dostane aj po operácii. K tomu, aby sa Vaše dieťa po operácii cítilo dobre, môžete pomôcť aj Vy, napríklad ak si s ním budete čítať z jeho obľúbenej knižky, ak mu dáte na hranie jeho obľúbenú hračku. A najmä tým, že budete hneď po operácii pri prebúdzaní Vášho dieťaťa pri jeho lôžku.

V záujme zdravia Vášho dieťaťa, nás prosím informujte, ak má Vaše dieťa:

- alergiu na lieky a potraviny;
- chronické ochorenie;
- zvýšenú krvácanosť pri úrazoch alebo po predchádzajúcich operáciách;
- lieky, ktoré dlhodobo užíva, lebo o nich pred operáciou musí vedieť anestéziológ;
- problémy s anestéziou (alebo niekto z blízkych príbuzných);
- snímateľný zubný strojček, kývajúce sa zuby alebo piercing.

Dieťa nesmie podstúpiť plánovanú operáciu v celkovej anestézii, ak:


- má alebo v posledných 2 - 3 týždňoch malo zápal dýchacích ciest;
- bolo v posledných 7 - 14 dňoch očkované;
- menej než 6 hodín pred operáciou jedlo.

Chceme Vás taktiež informovať, že žiadna anestézia nie je bez rizika. Komplikácie, ktoré ohrozujú život, sú však veľmi zriedkavé. Riziko znižujeme výberom vhodnej anestézie, sledovaním životných funkcií počas operácie aj po nej a využitím všetkých našich skúseností s detskou anestéziou. K zníženiu rizík spojených s operáciou a s anestéziou prispějete aj Vy a to dodržaním našich inštrukcií, ako aj dôsledným a pravdivým vyplnením nasledujúceho dotazníka.

Podpisom potvrdzujem, že som si pozorne prečítal/-a poučenie, že som pochopil/-a informácie o anestézii a že mi anestéziológ jasne odpovedal na všetky moje otázky.

Dátum:

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa:

 <p>Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.</p>	<p>INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENTA S PODANÍM ANESTÉZIE</p>	
--	---	---

PRACOVISKO: DETSKÉ KARDIOCENTRUM

Dotazník pred anestéziou

Vyplňte údaje alebo zakrúžkujte správnu odpoveď!

Meno a priezvisko dieťaťa: _____

Dátum narodenia: _____ Hmotnosť: _____

Moje dieťa:

- | | | |
|---|-----|-----|
| 1. bolo predčasne narodené | áno | nie |
| 2. má ochorenie pľúc | áno | nie |
| 3. má ochorenie krvi | áno | nie |
| 4. má ochorenie obličiek, svalov alebo kostí | áno | nie |
| 5. má ochorenie nervov | áno | nie |
| 6. má iné vážne chronické ochorenie, syndróm; napíšte aké/-ý: | áno | nie |
| 7. je alebo bolo v posledných 2-3 týždňoch choré | áno | nie |
| 8. má alergiu na lieky; napíšte na aké lieky: | áno | nie |
| 9. má alebo mávalo pri teplote kŕče | áno | nie |
| 10. má sklon ku krvácaniu z nosa alebo nadmernej tvorbe modrín | áno | nie |
| 11. bolo v posledných 2-3 týždňoch očkované | áno | nie |
| 12. malo v minulosti problémy súvisiace s operáciou, anestéziou | áno | nie |
| 13. pravidelne dlhodobo užíva lieky; napíšte aké: | áno | nie |
| 14. má snímateľný zubný strojček, kývajúce sa zuby alebo piercing | áno | nie |

Vyhlasujem, že dotazník som vyplnil/-a pravdivo a vedome som nezamlčal/-a dôležité údaje o zdravotnom stave môjho dieťaťa.

Vyhlasujem, že anesteziológ ma zrozumiteľne oboznámil so spôsobom anestézie, ktorý bude použitý pri operácii môjho dieťaťa a informoval ma o možných rizikách anestézie.

Potvrďujem, že súhlasím s navrhnutým postupom a po pohovore s lekárom - anesteziológom nemám ďalšie otázky.

Dátum:

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa:

Záver:	
Premedikácia:	
Lačnenie pred CA:	
ASA:	

Dátum:

Podpis a pečiatka anesteziológa: