

DEKONTAMINÁCIA MRSA PROTOKOL

Prípravok PRONTODERM foam

Umývanie vlasov: na vlasy naniest' penu Prontoderm foam a nechať zaschnúť.

Tvár:

Tvár umyť dôkladne roztokom Prontoderm pomocou štvorcov.

Všetky časti tváre musia byť roztokom dôkladne zvlhčené.

Očné kútiky a viečka pozorne očistiť tým istým štvorcom.

Očistené a dekontaminované časti nechať voľne uschnúť. Nezmývať.

Štvorec potom znehodnotiť.

Horná časť tela:

Od krku nadol vrchnú časť tela umývať čistým štvorcom napusteným roztokom Prontoderm a nechať uschnúť. Nezmývať.

Dolná časť tela:

Dolnú časť tela taktiež umývať čistým štvorcom napusteným roztokom Prontoderm.

Podľa potreby použiť viacero štvorcov. Nechať osušiť. Nezmývať.

Uši:

Vonkajšie časti uší vyčistiť vatovými tyčinkami mierne navlhčenými roztokom Prontoderm a nechať osušiť. Nezmývať.

Upozornenie nenavlhčiť príliš. Roztok Prontoderm sa nesmie tak ako iné roztoky dostať do zvukovodu.

Prípravok PRONT ORAL

Ústna hygiena:

Na výplach ústnej dutiny a hltanu použite roztok Pront Oral.

Intenzívna ústna hygiena 3 x denne klokať s 10ml neriedeného roztoku Pront Oral cca 60 sekúnd, vyplúť a opätovne nevyplachovať ústnu dutinu. Neprehĺtať.

U novorodencov, kojencov a malých detí povytierať dutinu ústnu špongiou na dutinu ústnu namočenú v roztoku Pront Oral.

Prípravok PRONTODERM gél light

Nos:

Nos dôkladne vyčistiť navlhčenou vatovou tyčinkou .

Čistenie nosa vykonať viackrát denne minimálne ráno, na obed a večer, aby sa v nose netvorili žiadne usadeniny, čím sa zabráni vzniku vhodnej pôdy pre tvorbu choroboplodných zárodkov. Špeciálnu starostlivosť venovať vestibulum nasi.

Nos vytierať na striedanie s BACTROBAN ung. 3x denne.

Ostatné predmety (okuliare, šperky, protézy atď.) je možné na povrchu dekontaminovať opláchnutím roztokom Prontoderm al. Meliseptol utierkami.

Z plastov je potrebné roztok po cca 5min. pôsobenia opláchnuť čistou teplou vodou.

Dezinfekcia okolia:

Súčasne s dekontamináciou pacienta by mala prebiehať dezinfekcia všetkých vodorovných plôch v izbe pacienta Meliseptol utierkami určených na plošnú dezinfekciu (čím sa zníži riziko opätovnej kontaminácie).

Po 3 dňoch skontrolovať kultivácie. Pri pozitívnych výsledkoch postup opakovať.

Obmedziť kontakt s pacientom počas dekontaminácie na minimum.